


AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-5-83220240



Ministère de l'Agriculture
Service de la Protection des Végétaux
Chemin d'Artigues - 33150 CENON

Aquitaine

Dordogne-Gironde-Landes-Lot&Garonne-Pyrénées Atlantiques

Abonnement annuel : 100,00 F



(56) 86.22.75



BULLETIN TECHNIQUE N° 32 - LUNDI 5 SEPTEMBRE 1983

GRANDES CULTURES

COLZA

Limaces :

La surveillance de l'activité de ces ravageurs nocturnes s'impose dès le semis. Les pullulations sont favorisées par l'enfouissement des pailles, l'absence de labour dans la préparation du sol, le maintien après la germination d'un temps humide. L'apparition de limaces se détecte aisément en disposant, de préférence dans l'endroit le plus humide de la parcelle, une poignée de granulés anti-limaces recouverts d'une tuile ou d'un sac. La présence de limaces mortes indique qu'un traitement en plein avec des micro-granulés de métaldéhyde à 5 % (nombreux produits commerciaux) ou de mercaptodiméthur (Mesuroi anti-limaces), peut être réalisé.

Désherbage de post-levée :

Le tableau ci-joint, complète les informations diffusées dans le précédent bulletin n° 31 du mercredi 31 août 1983.

TOURNESOL

Botrytis et Sclerotinia sur capitules

Le maintien d'un temps humide pendant la maturation peut justifier la pratique de la dessiccation chimique à l'aide de diquat à 400 g MA/ha. Cette application ne devra pas intervenir avant la maturité physiologique des graines (début du brunissement des bractées).

.../...

P549

PRODUITS COMMERCIAUX (Formulation) Concentration	DOSE/HA	CONDITIONS D'APPLICATION	EFFICACITE SUR :					MODE D'ACTION SUR LES ADVENTICES (Rémanence lorsqu'elle est connue)
			GRAMINEES		DICOTYLEDONES			
			Repousses de céréales et folles avoines	annuelles	vivaces	Crucifères	Autres	
LEGURAME PM (PM) 70 % carbétamide	3 kg PC/ha	Stade f 4 à 3 semaines avant reprise de végétation même sur sol gelé	+	+	-	-	-	Action racinaire Pluie nécessaire (2 mois)
KERB 50 W (PM) 50 % propyzamide	3 kg PC/ha (2 kg PC/ha en en rattrapage)	Stade B3 à reprise de végétation, même sol gelé sur	+	+	+ (5 à 6 l PC/ha sur chien- dent ram- pant de nov. à fin janv.)	-	-	Perturbe la photo- synthèse - pluie néces- saire - action lente (bonne rémanence par temps froid et humide)
KERB ULTRA (PM) 41,7 % propyzamide de 16,7 % d'atrazine	1,2 kg PC/ha	Stade B4 - avant l'hiver de préférence	+	+	+	-	+	Action foliaire et racinaire (bonne réma- nence par temps frais et en sol neutre)
FERVIN (PM) 75 % alloxidine-Na	0,75 kg PC/ha + 3 l huile	Entre levée et montaison des adventices, à tout stade du colza - éviter temps sec ou froid	+	+	+	-	-	Action foliaire - besoin de temps poussant (10 jours)
FUSILADE (C.E.) 250 g MA/l Fluazifop butyl	1,5 l PC/ha + 1 l huile	Sur adventices levées à partir du stade cotylé- donaire du colza	+	+	+	-	-	Action foliaire et racinaire (D'après SOPRA : 1 mois)

Sigles et symboles utilisés : PM = poudre mouillable - CE = concentré émulsifiable
+ = bonne efficacité - = efficacité moyenne à insuffisante